

18. Захворювання вен. Синдром верхньої порожнистої вени. Синдром нижньої порожнистої вени. Причини, діагностика, диференційна діагностика, лікувальна тактика. *

Хвора 55-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на відчуття важкості в лівій гомілці, періодичні нічні судоми литкових м'язів. Хворіє близько 5 років, відколи виникли вищевказані скарги. Не лікувалась. Об'єктивно: на медіальній поверхні лівої гомілки та стегна наявні щільні, варикозно розширені підшкірні вени, не болючі при пальпації. Встановіть діагноз:

Варикозне розширення підшкірних вен лівої нижньої кінцівки

Гострий тромбоз глибоких вен лівої нижньої кінцівки

Гострий висхідний тромбофлебіт підшкірних вен лівої нижньої кінцівки

Посттромботичний синдром лівої нижньої кінцівки

Облітеруючий атеросклероз судин лівої нижньої кінцівки

При профогляді у чоловіка 39 років, який не подає скарг, виявлено варикозне розширення підшкірних вен на передньо-внутрішній поверхні лівої гомілки, що виникло 4-5 років тому. Ваш діагноз?

Варикозна хвороба в стадії компенсації.

Варикозна хвороба в стадії субкомпенсації.

Варикозна хвороба в стадії декомпенсації.

Посттромботична хвороба.

Синдром Паркс-Вебера-Рубашова.

Хвора 47-ми років хворіє на варикозне розширення вен правої нижньої кінцівки. Скарги на біль, гіперемію вздовж підшкірних вен, підвищення температури тіла. При огляді великої підшкірної вени на гомілці і стегні спостерігається гіперемія до середньої третини; під час пальпації болісна, тверда. Яке лікування потрібне хворій?

Операція Троянова

Консервативна терапія

Склерозуюче лікування

Операція Фельдера

Операція Пальма

Хворий 48-ми років під час роботи на будівництві поранив варикозно змінену підшкірну вену на гомілці, що супроводжувалось інтенсивною венозною кровотечею. Вкажіть оптимальний варіант першої долікарської допомоги:

Стискаюча пов'язка та еластичне бинтування кінцівки

Накладання джгута Есмарха вище місця травми

Накладання джгута Есмарха нижче місця травми

Притиснення стегнової артерії в типовому місці

Максимальне згинання кінцівки в колінному суглобі

Хворий 43-х років переніс 3 роки тому тромбоз глибоких вен здухвинно-стегнового сегменту з правого боку. На сьогоднішній день турбують важкість, набряк правої нижньої кінцівки. Об'єктивно: помірний набряк гомілки, бура індурація шкіри у нижній третині гомілки, варикозно розширені поверхневі вени гомілки. Який найбільш вірогідний діагноз?

Післятромбофлебітичний синдром, варикозна форма

Гострий тромбоз вен з правого боку

Лімфедема правої нижньої кінцівки

Синдром Паркс-Вебера

Гострий тромбофлебіт поверхневих вен

Розвиток хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок залежить від функціонального стану так званої "м'язововенозної помпи". Відносно якої групи м'язів застосовується цей термін?

Гомілки

Черевної стінки

Сідничної ділянки

Стегна

Стопи