

15. Оклюзійні захворювання артерій. Синдром дуги аорти. Клініка, діагностика, консервативне та хірургічне лікування. *

Пацієнтка віком 20 років скаржиться, що впродовж трьох років відмічає похолодання пальців рук, вони набувають синюшно-білого кольору та стають нечутливими. За 5-10 хвилин виникає почервоніння шкіри і пальці теплішають, що супроводжується різким болем. Який найімовірніший діагноз?

Хвороба Рейно

Поліневрит

Облітеруючий атеросклероз

Облітеруючий ендартеріїт

Хвороба Бюргера

Пацієнт 72 років надійшов до відділення судинної хірургії зі скаргами на біль та мерзлякуватість нижніх кінцівок. УЗД артерій нижніх кінцівок виявило атеросклеротичне ураження судинної стінки. Який метод діагностики потрібний для уточнення локалізації та протяжності процесу?

Ангіографія

Рентгенографія органів грудної порожнини

ЕКГ

Термометрія

Рентгенографія кінцівки

Пацієнт віком 75 років скаржиться на задишку в стані спокою, виражену слабкість та аритмію. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, пульсація черевного відділу аорти, діастолічний аортальний шум. Під час пальпації виявлено: об'ємне утворення в мезогастрії та відсутність пульсації на стегнових артеріях. АТ - 70/40 мм рт. ст., олігурія. Який найімовірніший діагноз?

Розширююча аневризма аорти

Кіста підшлункової залози

Гострий перикардит

Тромбоемболія легеневої артерії

Інфаркт міокарда

Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль в лівій нижній кінцівці протягом року, переміжну кульгавість через 50-100 м, періодично є нічні болі. Об'єктивно спостерігається: ліва кінцівка бліда, холодна. Артеріальна пульсація відсутня на лівій гомілці. Який найімовірніший діагноз?

Облітеруючий ендартеріїт

Синдром Леріша

Синдром Рейно

Емболія аорти

Тромбоз аорти

Хвора М., 23 років, впродовж двох років відмічає похолодання пальців рук. При цьому вони набувають синюшно-білого кольору та стають нечутливими. Через 5-10 хвилин настає почервоніння шкіри і пальці теплішають, що супроводжується різким болем. Ваш попередній діагноз?

Хвороба Рейно

Поліневрит

Облітеруючий ендартерит

Облітеруючий атеросклероз

Хвороба Бюргера

Хворий 52-х років скаржиться на головний біль, слабкість лівої верхньої кінцівки. При фізичному навантаженні лівої кінцівки збільшуються неврологічні симптоми. Пульсація на артеріях лівої кінцівки різко ослаблена, на сонних артеріях - збережена. Який найбільш вірогідний діагноз?

Окклюзія лівої підключичної артерії, синдром "обкрадання"

Синдром торакального виходу

Синдром Рейно

Хвороба Такаясу

Окклюзія брахіоцефального стовбура

Чоловік 54 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на утруднення дихання, слабкість. Останні два тижні турбував біль та набряк правої нижньої кінцівки. Ці симптоми відчуває вперше в житті, раніше на обліку у лікаря не перебував. АТ - 110/70 мм рт. ст., ЧСС - 96/хв. Який діагностичний метод має вирішальне значення?

Мультиспіральна КТ ангіографія

Рентгенографія органів грудної клітки

Ехокардіографія

Функція зовнішнього дихання

Електрокардіографія

Чоловік 53-х років хворіє на цукровий діабет протягом 5-ти років. Звертається до лікаря зі скаргами на болі та судом в нижніх кінцівках, відчуття оніміння в них, мерзлякуватість. При обстеженні нижніх кінцівок ступні звичайного кольору, теплі на дотик, усі види чутливості значно знижені, гіперкератози, пульсація на артеріях кінцівок збережена. Яке ускладнення найбільш імовірно виникло у пацієнта?

Синдром діабетичної стопи, ішемічна форма

Синдром діабетичної стопи, змішана форма

Синдром діабетичної стопи, нейропатична форма

Облітеруючий ендартерит

Хронічна венозна недостатність

У чоловіка 65-ти років гостро виникли біль, парестезії, блідість лівої нижньої кінцівки. Об'єктивно: пульс на a.dorsalis pedis зліва відсутній. Відзначається похолодання шкіри та блідість, які поступово поширюються вгору по кінцівці. Ці симптоми з найбільшим ступенем вірогідності свідчать про:

Артеріальну оклюзію

Тромбофлебіт поверхневих вен

Грижа поперекового хребтового диска

Тромбофлебіт глибоких вен

Чоловік віком 28 років скаржиться на біль у лівій нижній кінцівці протягом 6 місяців, переміжну кульгавість, що з'являється після проходження 50-100 м, періодично нічні болі в кінцівці. Під час огляду кінцівка бліда, холодна, артеріальна пульсація відсутня на гомілці. Який імовірно діагноз у пацієнта?

Облітеруючий ендартеріїт

Облітеруючий атеросклероз

Емболія стегнової артерії

Хвороба Такаюсу

Синдром Рейно

Хвора 39-ти років впродовж 10-ти років хворіє на цукровий діабет. Останній рік відмічає похолодання пальців ніг, біль та відчуття оніміння. Об'єктивно: шкіра нижніх кінцівок суха, витончена, холодна на дотик, пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш вірогідний діагноз?

Діабетична мікроангіопатія судин нижніх кінцівок

Діабетична макроангіопатія судин нижніх кінцівок

Облітеруючий ендартеріїт судин нижніх кінцівок

Хвороба Рейно

Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок

Хворий Д., 29 років, поступив із скаргами на швидку втому, відчуття холоду в нижніх кінцівках, появу болю в м'язах гомілок при проходженні відстані до 300 м. Вважає себе хворим протягом 6 років і пов'язує початок хвороби із переохолодженням. Шкірні покриви нижніх кінцівок на рівні стоп та нижньої третини гомілки з блідим відтінком, прохолодні на дотик, з бідним оволосінням на гомілці, витончені, сухі. Пульсацію на артеріях обох нижніх кінцівок визначено на стегновій артерії, на підколінній пульсація ослаблена, на артеріях ступні – відсутня. Який з попередніх діагнозів найбільш ймовірний?

Облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок

Облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок

Хвороба Рейно

Неспецифічний аорто-артеріїт

Діабетична ангіопатія

Хворий 30 років, скарги на біль в правій нижній кінцівці протягом року, переміжну кульгавість через 50-100 м, періодично нічні болі. При огляді кінцівка бліда, холодна. Артеріальна пульсація відсутня на гомілці. Який найбільш імовірний діагноз?

Облітеруючий ендартеріїт

Синдром Леріша

Синдром Рейно

Емболія аорти

Тромбоз аорти

У хворої 65 років при пальпації живота в області пупка і вище пальпується пухлина розмірами 13х8 см, помірно болісна при пальпації, не зміщується, пульсує. При аускультції систолічний шум. Ваш діагноз?

Аневризма черевної аорти

Пухлина сигмовідної кишки

Пухлина лівої нирки

Кіста підшлункової залози

Пухлина позаочеревної порожнини.

Хвора В., 68 років, скаржиться на біль при ходінні до 200 метрів в лівій нижній кінцівці, почуття затерпнутості в лівій ступні у нічний час. При об'єктивному огляді – ліва ступня має зниження шкіряної температури, артеріальна пульсація відсутня на підколінній артерії ліворуч. Зазначте діагноз.

Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок

Гостре порушення мозкового кровообігу

Гострий тромбофлебіт поверхових вен лівої нижньої кінцівки

Ендартеріїт судин нижніх кінцівок

Лімфогоїт судин нижніх кінцівок